

**Kolorektale Karzinome: Individualisierte Tumornachsorge.**

--	--

**I Nachsorge-Pass-Variation**

Name, Vorname

Geb.-Datum

<b>OP-Datum</b>			<b>Tumor-Klassifikation</b>	<b>pT</b>	<b>pN</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	
	Monat	Jahr						

**I Rektum-Karzinom: aktuelle Empfehlungen nach lokaler Exzision oder Polypektomie**

	postoperatives Jahr	1			2			3			4		5				
postoperativer Monat		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	42	48	54	60
Anamnese					+		+										
Informationsgespräch					+		+										
Klinische Untersuchung					+		+										
Rekto-/Sigmoidoskopie, evtl. EUS					+		+										
Hohe Koloskopie*			§														

Anmerkungen :  
 \*: drei Monate postoperativ , wenn präoperativ Abklärung des gesamten Colons nicht möglich.  
 Auch nach dem 5. Jahr alle drei Jahre Coloskopie, als Früherkennung von Polypen bzw. Zweitkarzinomen.  
 #: UICC-Stadium I: T<sub>is</sub>, T<sub>1</sub> + 2 N<sub>0</sub> M<sub>0</sub>  
 +: nach endoskopischer Abtragung eines gestielten Polypen mit pT<sub>1</sub>-Karzinom low risk, sind bei tumorfreier Polypenbasis die Nachuntersuchungen nach 12 und 18 Monaten entbehrlich.  
 §: individuelle Zusatz-US, je nach Befundlage und Risikoabschätzung. Anstatt der ersten Sigmoidoskopie.

Bearbeitung und Copyright: Dr. G. Herold, FA Innere Medizin und Gastroenterologie, Proktologie

Terminvorgaben:	Termin-Datum:	Ergebnis:
1. Jahr, Monat 6		
2. Jahr, Monat 12		
5. Jahr, Monat 12		
8. Jahr, Coloskopie		